



دستور العمل تزریق داخل جلدی

دستور دارویی را چک ، کارت دارویی با کاردکس دارویی چک و به ۵ اصل دارودرمانی توجه کنید.

مددجو را شناسایی و با وی ارتباط برقرار کنید . هدف و روش انجام کار را برای وی شرح دهید.

وسایل را آماده کنید : پنبه الکل - سرنگ و سوزن مناسب (سرنگ 1cc - نیدل ۲۸ - ۲۶ و طول ۰/۵ اینچ)
- ظرف مخصوص اجسام نوک تیز - ویال و یا آمپول مورد نظر - کارت دارویی

دستها را بشوئید

دستکش یکبار مصرف را بپوشید.

خلوت مددجو را حفظ کنید.

با روش صحیح مقدار داروی مورد نظر را محاسبه و از ویال و یا آمپول بکشید.

مددجو را در وضعیت خوابیده و یا نشسته که قسمت ساعد دست قابل دیدن باشد، قرار دهید

محل تزریق در قسمت داخل ساعد دست که فاقد مو ، تورم ، التهاب و قرمزی باشد
را انتخاب نموده و با پنبه الکل و یا بتادین از مرکز به خارج به صورت دورانی تمیز کنید.

پوشش سوزن را برداشته و سرنگ را در دست غالب گرفته و با دست دیگر پوست محل تزریق را بکشید.

سرنگ را در زاویه ۱۵ - ۱۰ درجه تقریباً مماس با پوست نگه دارید و در حالی که نوک مورب آن به طرف بالا باشد
وارد پوست کنید به نحوی که نوک سر سوزن در پوست مشخص باشد . سوزن دقیقاً در زیر اپیدرم قرار گیرد.

سوزن را ثابت نگه داشته و به آرامی ، بدون اسپیراسیون طی مدت ۳ تا ۵ ثانیه به اندازه یک عدس دارو را تزریق کنید.

سوزن را با همان زاویه ای که وارد بدن کرده خارج کنید و از فشار دادن و تمیز نمودن محل تزریق خودداری کنید.

سرنگ و سوزن را بدون گذاشتن درپوش در ظرف مخصوص اجسام نوک تیز بیاندازید.

دستکش را بیرون بیاورید.

اطراف محل تزریق را تا شعاع دو سانتی متری علامت گذاری کنید.

مددجو را در وضعیت مناسب قرار دهید و دستها را بشوئید.

به مددجو یادآور شوید برای کنترل عکس العمل پوستی، تست آلرژی

۱۵ تا ۶۰ دقیقه و تست سل ۷۲ ساعت بعد از تزریق مراجعه کنید.

به مددجو آموزش دهید محل تزریق را مالش ندهد ، آن را نپوشاند و ماده جدیدی بر روی آن قرار ندهد.

نوع دارو ، ساعت تزریق و عکس العمل مددجو را در گزارش پرستاری ثبت کنید.

تصاویر نحوه تزریق داخل جلدی

مراحلی از انجام تزریق زیر جلدی

