



## دستورالعمل نحوه تجویز قطره گوش

دستور پزشکی ( پرونده و کاردکس ) را بررسی کنید و به ۵ اصل صحیح دارودرمانی توجه کنید.

مددجو را شناسایی کنید ، با وی ارتباط برقرار کنید، هدف و روش انجام کار را برای وی شرح دهید.

وسایل مورد نیاز را آماده کنید: دستکش، قطره گوش مناسب، اپلیکاتور یا پنبه

نام، تاریخ انقضاء و سایر مشخصات داروی مورد نظر را چک کنید.

دستها را بشویید.

دستکش یکبار مصرف بپوشید.

گوش مورد نظر را مشخص کنید و مددجو را به طرف گوش سالم بخوابانید.

گوش خارجی و مجرای گوش را از نظر هرگونه آسیب یا تغییر رنگ و ترشح بررسی نمایید.

مجرای گوش مددجو را توسط اپلیکاتور ، پنبه یا نرمال سالین تمیز کنید.

لاله گوش را به طرف بالا و عقب ( در بالغین ) و یا به طرف پایین و عقب ( در اطفال ) بکشید.

دارو را انتخاب کنید و برچسب نام، دوز دارو و تاریخ انقضاء را با دقت بخوانید.

قطره چکان را یک سانتی متر بالاتر از مجرای گوش قرار دهید و دارو را بچکانید.

از مددجو درخواست کنید مدت ۲ تا ۳ دقیقه در پوزیشن پهلو باقی بماند.

دستکش ها را بیرون بیاورید.

وسایل آلوده را جمع آوری کنید و مددجو را در پوزیشن راحت قرار دهید.

زمان، مقدار، محل تجویز و عکس العمل دارویی مددجو را در برگه گزارش مددجو ثبت کنید.

## تصاویر نحوه تجویز قطره گوش

مراحلی از فرایند ریختن قطره گوش



دستکش یکبار مصرف بپوشید.



دستها را بشویید.



مجرای گوش مددجو را توسط اپلیکاتور، پنبه و یا نرمال سالین تمیز کنید.



گوش خارجی و مجرای گوش را از نظر هرگونه آسیب یا تغییر رنگ ترشح بررسی نمایید.



لاله گوش را در اطفال به طرف پایین و عقب بکشید.



لاله گوش را در بالغین به طرف بالا و عقب بکشید.



از مددجو درخواست کنید مدت ۲ تا ۳ دقیقه در پوزیشن پهلو باقی بماند.



قطره چکان را یک سانتی متر بالاتر از مجرای گوش قرار دهید و دارو را بچکانید.