



جناب آقای دکتر رستمی پور

ریاست محترم مرکز آموزشی، درمانی استاد مطهری

جناب آقای دکتر آزاد

ریاست محترم بیمارستان خاتم الانبیاء خفر

با سلام و احترام؛

با توجه به اهمیت ارزیابی پایه ای کیفیت مراقبت مادران، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ثبت موارد ذیل به عنوان عوارض شدید بارداری و مادران نزدیک به مرگ در سامانه مربوطه اقدام شود:

۱. پره اکلامپسی شدید با علائم:

- درد اپی گاستر
- الیگوری: کاهش حجم ادرار به میزان ۵۰ سی سی در ۲۴ ساعت یا ۰/۵ سی سی در ساعت به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
- افزایش آنزیم های کبدی به میزان ۲ برابر یا بیشتر
- بیلی روبین بیشتر از ۶ میلی گرم در دسی لیتر
- کراتینین مساوی یا بیشتر از ۳
- پلاکت کمتر از ۵۰/۰۰۰ در میلی لیتر
- سندرم hellp اگر بیمار intubate شود، دچار شوک شود، بیلی روبین بالای ۶ داشته باشد، cr بالای ۳ داشته باشد، دیالیز شود و تشنج کند nearmiss است در غیر اینصورت جزو عوارض شدید است.

۲. اکلامپسی

۳. سپسیس یا عفونت سیستمیک شدید

۴. پارگی رحم

۵. عوارض شدید سقط، حاملگی خارج از رحم، مول

۶. خونریزی شدید: افت Hb حداقل ۳ گرم در دسی لیتر می تواند نشانه خونریزی باشد. خونریزی حتی در صورتی که فقط به نظر زیاد باشد هم باید در فرم گزارش فوری ثبت شود (حتماً نیاز به تزریق ۵ واحد خون و یا فراورده یا بستری در ICU نیست). لذا لازم است دیده بان های اتاق عمل، ریکواری، اتاق زایمان و بخش را تقویت و مرتب یادآوری نمائیم.

۷. حضور در ICU

۸. مداخلات رادیولوژی (آمبولیزیشن عروق) در مورد خونریزی کف لگن، درمان میوم ها و همانژیوم است.
۹. لاپاراتومی مانند هیستریکتومی (به جز سزارین): لاپاراتومی که برای باردوم به اتاق عمل می رود جزو severmorbidity محسوب می شود (چه برای هیستریکتومی چه برای خارج کردن تامپون)
- حاملگی خارج از رحم اگر خونریزی شدید داشت (نه به خاطر لاپاراتومی و نه به خاطر سالپنژکتومی) یا اگر همراه با Sepsis باشد nearmiss محسوب می شود.
- سزارینی که حین عمل خونریزی شدید می دهد و مادر میزوپروستول دریافت می کند جزو nearmiss محسوب می شود.
۱۰. استفاده از فرآورده های خونی: نوع فرآورده های خونی مهم نیست. اگر بیشتر از ۵ واحد باشد باید ثبت شود.

۱۱. اختلال قلبی عروقی

- شوک
- ایست قلبی
- استفاده مستمر از داروهای وازواکتیو
- احیای قلبی-ریوی
- اسیدوز شدید (PH کمتر از ۷)، کاهش خون رسانی بافتی (لاکتات بیشتر از ۵ میلی مول در لیتر)

۱۲. اختلال عملکرد تنفسی

- سیانوز حاد
- نفس نفس زدن
- تاکی پنه شدید (بیش از ۴۰ تنفس در دقیقه)
- برادی پنه شدید (کمتر از ۶ تنفس در دقیقه)
- لوله گذاری و ونتیلاسیون غیر مرتبط با بیهوشی
- هیپوکسی شدید (اشباع اکسیژن کمتر از ۹۰٪ در ۶۰ دقیقه)

۱۳. اختلال خونی و انعقادی

- اختلال در تشکیل لخته
- تزریق خون مساوی یا بیشتر از ۵ واحد
- ترومبوسیتوپنی شدید حاد (پلاکت کمتر از ۵۰/۰۰۰ در میلی لیتر)

۱۴. اختلال عملکرد کبدی

- زردی در حضور پره اکلامپسی

- بیلی روبین بیشتر از ۶ میلی گرم در دسی لیتر
- ۱۵. اختلال عملکرد مغز و اعصاب
- بیهوشی طولانی مدت (بیشتر یا مساوی ۱۲ ساعت)
- کما (از جمله کمای دیابتیک)
- سکته مغزی
- صرع غیر قابل کنترل
- فلج کامل
- ۱۶. اختلال عملکرد رحم
- هیستریکتومی به دلیل خونریزی یا عفونت پیش رونده رحمی

دکتر قهرمان بانا
معاون درمان دانشگاه

اقدام کننده : خانم ثنایی