

## شیوع هیپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در آرایشگران استان کرمانشاه (۹۰-۱۳۸۷)

Meghdad Pirsahab, Zahra Atafar, Abdollah Dargahi, Fatemeh Asadi, Amir Karami,  
Fatemeh Rezaei

### چکیده

ایران از نظر آندمیسیته عفونت مزمن هیپاتیت B جزء کشورهای مزواندمیک (۷-۲٪) است. این پژوهش از نوع توصیفی-مقطعی است. در این بررسی تمامی (۲۶۹۰ نفر) آرایشگران زن و مرد شاغل در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات برای انجام این تحقیق چکلیست بود. نتایج نشان داد که شیوع هیپاتیت B، 92/0 درصد می‌باشد. شیوع بیماری در افراد با سنین بیش از ۶۰ سال و سابقه کار بیش از ۲۰ سال، افراد غیرواکسینه و در مردان بیشتر بود. اولین اقدام جهت پیشگیری از هیپاتیت B برنامه آموزش مداوم آرایشگران و مؤثرترین و مقرون به صرفه‌ترین وسیله پیشگیری از هیپاتیت B، واکسیناسیون است.

**کلید واژه:** هیپاتیت B، آرایشگران، شیوع، کرمانشاه